

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	キッズバファリンシロップ S
2	成分・分量	60mL 中 アセトアミノフェン 300mg、ジフェンヒドラミン塩酸塩 25mg
3	用法・用量	次の1回量を1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用してください 場合により4時間の間隔をおいて、1日6回まで服用して差し支えありません 3歳以上7歳未満 10mL、1歳以上3歳未満 7.5mL、6ヶ月以上1歳未満 6mL、 3ヶ月以上6ヶ月未満 5mL、3ヶ月未満は服用しないこと
4	効能・効果	かぜの諸症状(発熱、悪寒、頭痛、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、 関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください</p> <p>(1) 本剤又は本剤によりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください</p> <p>他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬 (鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気があらわれることがあります)</p> <p>4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</p> <p>5. 服用前後は飲酒しないでください</p> <p>6. 長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師又は歯科医師の治療を受けている人 ・ 妊婦又は妊娠していると思われる人 ・ 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・ 高熱、排尿困難の症状のある人 ・ 心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障の診断を受けた人 <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。