

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ムヒのこどもかぜ顆粒a
2	成分・分量	1日量3包(4.5g)中 アセトアミノフェン 450 mg、 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.75 mg、チペピジンヒベンズ酸塩 37.5 mg、 dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩 30 mg
3	用法・用量	7才以上11才未満 1包、3才以上7才未満 2/3包、1才以上3才未満 1/2包、 1才未満 服用しないこと 1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。
4	効能・効果	かぜの諸症状(鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、 頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の 危害を防止す るために必要 な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください</p> <p>(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。</p> <p>(3)フェニルケトン尿症の人。(本剤はL-フェニルアラニン化合物を含有するため。)</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください</p> <p>他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)。</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください</p> <p>(眠気等があらわれることがあります。)</p> <p>4. 服用前後は飲酒しないでください</p> <p>5. 長期連用しないでください</p> <p>次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師又は歯科医師の治療を受けている人。</li> <li>・妊婦又は妊娠していると思われる人。・授乳中の人。・高齢者。</li> <li>・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>・次の症状のある人。高熱、排尿困難</li> <li>・次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障</li> </ul> <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。