

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ムヒのこども解熱鎮痛顆粒
2	成分・分量	1日量3包(3.6g)中 アセトアミノフェン 450 mg、 アスコルビン酸(ビタミンC) 150 mg グリシン 450 mg
3	用法・用量	7才以上11才未満 1回 1包、3才以上7才未満 1回 2/3包、 1才以上3才未満 1回 1/2包、1才未満 服用しないこと 1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。
4	効能・効果	1) 悪寒・発熱時の解熱 2) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 (3)フェニルケトン尿症の人。(本剤はL-フェニルアラニン化合物を含有するため。) 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬。 3. 服用時は飲酒しないでください 4. 長期連用しないでください 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください ・医師又は歯科医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・高齢者。 ・本人又は家族がアレルギー体質の人。 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。