

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第 類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	リポスミン
2	成分・分量	1日量(2錠)中 ジフェンヒドラミン塩酸塩・・・・・・・・・・50mg
3	用法・用量	寝つきが悪い時や眠りが浅い時、 成人(15歳以上) 1回2錠1日1回就寝前に服用する。
4	効能・効果	一時的な不眠の次の症状の緩和：寝つきが悪い、眠りが浅い
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください。 (1) 妊婦または妊娠していると思われる人。 (2) 15歳未満の小児。 (3) 日常的に不眠の人。 (4) 不眠症の診断を受けた人。</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 他の催眠鎮静薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を 含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)</p> <p>3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください。</p> <p>4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて ください。</p> <p>5. 服用時は飲酒しないでください。</p> <p>6. 寝つきが悪い時や眠りが浅い時のみの服用にとどめ、連用しないでくだ さい。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください。 医師の治療を受けている人。 高齢者。 本人または家族がアレルギー体質の人。 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 次の症状のある人。 排尿困難 次の診断を受けた人。 緑内障、前立腺肥大</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	翌日まで眠気が続いたり、だるさを感じることがあります。 販売は1人1包装まで

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗
の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。