

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	サクロン錠
2	成分・分量	成人 1 日量 12 錠中 銅クロロフィリンカリウム 120mg 、無水リン酸水素カルシウム 1,020mg 沈降炭酸カルシウム 1,020mg 、水酸化マグネシウム 960mg ロートエキス 30mg ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	成人(15 歳以上) 1 回 4 錠 、8 歳以上 15 歳未満 1 回 2 錠 1 日 3 回、食間および就寝前の空腹時に水またはお湯で服用してください。 8 歳未満は服用しないこと * 食間とは、食後 2 時間ほど経過し、胃の中に食べた物がほぼなくなっている時です。 [用法・用量に関連する注意] 小児(8 歳以上 15 歳未満)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
4	効能・効果	胸やけ、飲みすぎ、胃痛、胃酸過多、胃もたれ、胃部不快感、胃部膨満感、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 胃腸鎮痛鎮痙薬 2.授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。 (母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。) 【次に該当する人はお申し出ください】 ●医師の治療を受けている人 ●妊婦又は妊娠していると思われる人 ●高齢者 ●薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ●次の症状のある人 排尿困難 ●次の診断を受けた人 腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害 (2012 年 9 月添付文書より抜粋)
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。