

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	スクラートG
2	成分・分量	1日服用量(3包・17.4g)中 スクラルファート水和物 1500mg、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 1500mg、 合成ヒドロタルサイト 750mg、コウボク流エキス 0.6mL(原生薬換算量 0.6g)、 ソウジュツ流エキス 0.6mL(原生薬換算量 0.6g)
3	用法・用量	成人(15才以上)1回1包、1日3回、食前または食間・就寝前に服用 15才未満の小児は服用しないこと
4	効能・効果	胃痛、胸やけ、胃酸過多、げっぷ(おくび)、もたれ(胃もたれ)、胃重、胃部膨満感、 胃部不快感、胸つかえ、飲み過ぎ(過飲)、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、 胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用しないでください 透析療法を受けている人 2. 長期連用して服用しないでください 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・腎臓病の診断を受けた人
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。