

こみあげる胃酸に速攻

(速効性制酸剤配合)

スーツと効く!

パンシロン®

キュア

胃痛・胃酸逆流  
などによる胸やけに

食前の空腹時にも、食後にも飲める



1回2錠

飲みやすい  
錠剤 タイプ

ロート製薬



第2類医薬品

〈販売名〉パンシロンキュアSP錠

お気軽にお相談ください。

東京:03-5442-6020

大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00

(土、日、祝日を除く)

-----切り取り線-----

吸湿しないように、服用のつどチャックをしっかりしめること

胃腸薬

**【効能・効果】** 胃痛、胸やけ、胃酸过多、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)

### ⚠ 使用上の注意

☒ [してはいけないこと] (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと: 胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある)
4. 長期連用しないこと



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 授乳中の女性 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人: 排尿困難 (6) 次の診断を受けた人: 緑内障、腎臓病、甲状腺機能障害、フェニルケトン尿症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はきけ、胃部膨満感
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難
その他	目のかすみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	服用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。便秘、下痢、口のかわき
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

**【用法・用量】** 次の1回量を1日3回食前または食後に、水又はお湯で服用すること。

15才以上…1回2錠、15才未満…服用しないこと <用法・用量に関する注意> 用法・用量を厳守すること。【成分・分量】(6錠中)

水酸化マグネシウム 450mg、合成ヒドロタルサイト 780mg、沈降炭酸カルシウム 900mg、アルジオキサ 150mg、ビレンゼビン塩酸塩水和物 46.9mg、炭酸水素ナトリウム 240mg、チンピ末 300mg、添加物として、L-アルギニン、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、クロスカルメロースナトリウム、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、ステアリン酸Mg、メントール、香料を含む。【保管及び取扱上の注意】(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。(5) まれに錠剤に黒い点がみられるが品質には問題ない。

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

ロート製薬株式会社 大阪市生野区巽西1-8-1

お客様安心サポートデスク : 06-6758-1230

13898220F