

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名称	シオノギ胃腸薬K 細粒
2	成分・分量	カルニチン塩化物 200mg, ケ化末 300mg, チョウジ末 50mg, ケンチアナ末 50mg, ガジツ末 50mg, ニンジン末 100mg, アカモシ末 300mg, 銅クロロフィリンナトリウム 45mg, ビオチン末 60mg, プロザイム 20mg, リパーゼ AP6 60mg, 炭酸水素ナトリウム 800mg, 沈降炭酸カルシウム 800mg, 炭酸マグネシウム 500mg, ロートエキス 3 倍散 90mg (ロートエキスとして 30mg)
3	用法・用量	次の量を食後におのみください。 成人(15才以上): 1回1包, 1日3回 11才以上15才未満: 1回2/3包, 1日3回 8才以上11才未満: 1回1/2包, 1日3回 5才以上8才未満: 1回1/3包, 1日3回 5才未満: 服用させないこと
4	効能・効果	○もたれ(胃もたれ), 胸つかえ, 胃部・腹部膨満感, 胃弱 ○食欲不振(食欲減退), 消化不良, 消化促進, 食べ過ぎ(過食) ○胸やけ, はきけ(むかつき, 胃のむかつき, 二日酔・悪酔のむかつき, 嘔気, 悪心), 嘔吐, 飲み過ぎ(過飲) ○胃部不快感, げっぷ(おくび), 胃重, 胃痛, 胃酸過多
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 本剤を服用している間は, 次の医薬品を服用しないでください 胃腸鎮痛鎮痙薬 2. 授乳中の方は本剤を服用しないか, 本剤を服用する場合は授乳を避けてください (母乳に移行して, 乳児の脈が速くなることがあります) 次に該当する人はお申し出ください (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人 (5) 次の症状のある人 排尿困難 (6) 次の診断を受けた人 腎臓病, 心臓病, 緑内障
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。