

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	太田胃散 A <錠剤>																								
2	成分・分量	<p>9 錠（1 日量）中</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リパーゼ AP6</td> <td>60 mg</td> </tr> <tr> <td>プロザイム 6</td> <td>30 mg</td> </tr> <tr> <td>ビオザスターゼ 1000</td> <td>60 mg</td> </tr> <tr> <td>ウルソデオキシコール酸</td> <td>12.6 mg</td> </tr> <tr> <td>炭酸水素ナトリウム</td> <td>1530 mg</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合成ヒドロタルサイト</td> <td>900 mg</td> </tr> <tr> <td>沈降炭酸カルシウム</td> <td>270 mg</td> </tr> <tr> <td>ケイヒ油</td> <td>10.40 mg</td> </tr> <tr> <td>レモン油</td> <td>4.46 mg</td> </tr> <tr> <td>ウイキョウ油</td> <td>1.65 mg</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	リパーゼ AP6	60 mg	プロザイム 6	30 mg	ビオザスターゼ 1000	60 mg	ウルソデオキシコール酸	12.6 mg	炭酸水素ナトリウム	1530 mg	成分	分量	合成ヒドロタルサイト	900 mg	沈降炭酸カルシウム	270 mg	ケイヒ油	10.40 mg	レモン油	4.46 mg	ウイキョウ油	1.65 mg
成分	分量																									
リパーゼ AP6	60 mg																									
プロザイム 6	30 mg																									
ビオザスターゼ 1000	60 mg																									
ウルソデオキシコール酸	12.6 mg																									
炭酸水素ナトリウム	1530 mg																									
成分	分量																									
合成ヒドロタルサイト	900 mg																									
沈降炭酸カルシウム	270 mg																									
ケイヒ油	10.40 mg																									
レモン油	4.46 mg																									
ウイキョウ油	1.65 mg																									
3	用法・用量	<p>次の量を食後又は食間（就寝前を含む）に服用してください。ただし、食欲不振の場合は食前に服用してください。かんで服用してもさしつかえありません。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1 回量</th> <th>1 日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人（15 歳以上）</td> <td>3 錠</td> <td rowspan="3">3 回</td> </tr> <tr> <td>8～14 歳</td> <td>2 錠</td> </tr> <tr> <td>5～7 歳</td> <td>1 錠</td> </tr> <tr> <td>5 歳未満</td> <td colspan="2">服用しないこと</td> </tr> </tbody> </table> <p>（食間とは食後 2～3 時間のことをいいます。）</p>		年齢	1 回量	1 日服用回数	成人（15 歳以上）	3 錠	3 回	8～14 歳	2 錠	5～7 歳	1 錠	5 歳未満	服用しないこと											
年齢	1 回量	1 日服用回数																								
成人（15 歳以上）	3 錠	3 回																								
8～14 歳	2 錠																									
5～7 歳	1 錠																									
5 歳未満	服用しないこと																									
4	効能・効果	<p>胃もたれ、食べすぎ、胃痛、胸やけ、食欲不振、消化不良、消化促進、飲みすぎ、胃酸過多、胸つかえ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、胃弱、胃重、嘔吐、げっぷ、はきけ（胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）</p>																								
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 透析療法を受けている人は服用しないでください 2. 長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師の治療を受けている人。 ・ 妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・ 本人又は家族がアレルギー体質の人。 ・ 薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。 ・ 腎臓病の診断を受けた人。 																								
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																									

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

商品名

太田胃散 A <錠剂>

2008年11月5日上市

太田胃散A<錠剂>成分助消化淀粉、蛋白质、脂肪，改善胃灼热等胃肠不适症状，提高胃肠功能。

特征

◎本药品对于油腻食物及饮食过量造成的各种不适症状，具有特效。

◎按照症状，随时可以服用：感到胃肠胀满、食滞时，餐后或餐间服用；食欲不振时，餐前服用。

◎药片小巧，崩解度高、溶化迅速。

◎铝箔小包，便于携带。



成分 一日量 (9片) 中

脂肪酶AP6 -----	60 mg
蛋白水解酶6 -----	30 mg
生物淀粉酶1000 -----	60 mg
熊去氧胆酸 -----	12.6 mg
碳酸氢钠 -----	1530 mg
合成铝碳酸镁 -----	900 mg
沉淀碳酸钙 -----	270 mg
桂皮油 -----	10.4 mg
柠檬油 -----	4.46 mg
茴香油 -----	1.65 mg

添加物：薄荷脑、乳糖、黄色4号（柠檬黄）、阿拉伯树胶、硬脂酸镁、碳酸镁、羧甲基纤维素钙、纤维素、天然维生素E

制造贩卖公司	株式会社 太田胃散		
药物剂型	片 剂		
分类	第二类医药品		
药品项目	45片	120片	300片
推荐价格	680日元	1,200日元	2,280日元
JAN code	4987033209135	4987033811055	4987033811116
有效期限	4年		

效能主治

饮食过量、胃灼热、胃部不适、胃肠虚弱、食滞饱胀、胃痛、消化不良、食欲不振、胃酸过多、脘腹痞满、恶心呕吐、嗝气

用法・用量

口服。餐后、两餐之间或临睡前服用。
食欲不振，餐前服用。
也可以咀嚼服用。

年龄	1次量	服用数次
成人 (15岁以上)	3片	1日3次
8~14岁	两片	
5~7岁	1片	
未滿5岁	不宜服用	