

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	サクロンQ
2	成分・分量	成人 1 回量 2 錠中 オキセサゼイン 5mg ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	成人(15 歳以上)は 1 回 2 錠を 1 日 3 回まで水またはお湯で服用してください。 服用間隔は 4 時間以上おいてください。 小児(15 歳未満)は服用しないこと。 [用法・用量に関連する注意] かまずにすぐのみこんでください。(早くとける錠剤ですので、成分が口の中に 広がると口内にしびれが残ります。)
4	効能・効果	胃痛、腹痛、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、 悪心)、嘔吐、さしこみ(疝痛、癩)、胸やけ、胃酸過多、胃部不快感、げっぷ(おくび)
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用しないでください (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (2) 15 歳未満の小児 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の胃腸薬(ロートエキスを含有する製剤)、他の胃腸鎮痛鎮痙薬 3. 長期連用しないでください 【次に該当する人はお申し出ください】 ● 医師の治療を受けている人 ● 高齢者 ● 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。