

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ストツパ下痢止め EX												
2	成分・分量	1回服用量(1錠)中 ロートエキス3倍散 60mg(ロートエキスとして 20mg)、 タンニン酸ベルベリン 100mg												
3	用法・用量	次の量を噛みくだくか、口の中で溶かして服用してください。 <table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1回量</th><th>1日服用回数</th><th>服用間隔</th></tr></thead><tbody><tr><td>成人(15才以上)</td><td>1錠</td><td>3回を限度とする</td><td>4時間以上あける</td></tr><tr><td>15才未満</td><td colspan="3">×服用しないでください</td></tr></tbody></table>	年齢	1回量	1日服用回数	服用間隔	成人(15才以上)	1錠	3回を限度とする	4時間以上あける	15才未満	×服用しないでください		
年齢	1回量	1日服用回数	服用間隔											
成人(15才以上)	1錠	3回を限度とする	4時間以上あける											
15才未満	×服用しないでください													
4	効能・効果	腹痛を伴う下痢、下痢、消化不良による下痢、食あたり、水あたり、はき下し、 くだり腹、軟便												
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗り物酔い薬 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある) 3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください (母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある)  次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人 ・急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人 (本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある) ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・排尿困難の症状がある人 ・心臓病、緑内障の診断を受けた人												
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項													

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。