

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	キッズバファリンせきどめシロップ S
2	成分・分量	60mL 中 デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物 20mg、 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 25mg、グアイフェネシン 100mg、 キキョウ流エキス 0.66mL(原生薬換算量 660mg)、 セネガ流エキス 0.66mL(原生薬換算量 660mg)、ジフェンヒドラミン塩酸塩 30mg
3	用法・用量	次の1回量を1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。場合により4時間の間隔をおいて、1日6回まで服用して差し支えありません。 5歳以上8歳未満 10mL、3歳以上5歳未満 7.5mL、1歳以上3歳未満 6mL、 3ヵ月以上1歳未満 3mL、3ヵ月未満は服用しないこと
4	効能・効果	せき、たん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1.次の人は服用しないでください 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬 3.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気があらわれることがあります) 4.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・高熱、排尿困難の症状のある人 ・心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害の診断を受けた人 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。