

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第2類医薬品		使用前には必ず添付文書を読んで下さい
1	名称	サンテPC
2	成分・分量	ビタミンB12(シアノコバラミン) 0.02% コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 0.5% ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩) 0.1% ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.002% タウリン 0.1% グリチルリチン酸二カリウム 0.1% クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.01% 塩酸テトラヒドロゾリン 0.03%
3	用法・用量	1回1～3滴、1日5～6回点眼してください。
4	効能・効果	紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目のかゆみ、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 次の症状のある人 はげしい目の痛み (4) 次の診断を受けた人 緑内障 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。 [関係部位:症状] 皮ふ:発疹・発赤、かゆみ 目:充血、かゆみ、はれ 3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください (1) 目のかすみが改善されない場合 (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。