## 医薬品を正しく購入するための

## 説明文書

## 指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	キッズバファリン鼻炎シロップ S
2	成分・分量	60mL 中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg、 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 55mg、サイシン流エキス 0.2mL(原生薬換算量 0.2g)
3	用法・用量	次の1回量を1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。場合により約4時間の間隔をおいて、1日6回まで服用して差し支えありません。 7歳以上11歳未満10mL、3歳以上7歳未満6mL、1歳以上3歳未満5mL、6ヵ月以上1歳未満4mL、3ヶ月以上6ヶ月未満3mL、3ヵ月未満は服用しないこと
4	効能・効果	急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和:くしゃみ、 鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬) 2.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気があらわれることがあります) 3.長期連用しないでください次に該当する人はお申し出ください・医師の治療を受けている人・妊婦又は妊娠していると思われる人・授乳中の人・高齢者・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人・尿困難の症状のある人・緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧の診断を受けた人 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

## 〔注意事項〕

- 1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。