

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

漢方製剤

第2類医薬品

ツムラの漢方製剤

ツムラ漢方麻黄湯エキス顆粒

「麻黄湯」は、漢方の原典である『傷寒論』に記載されている漢方薬で、さむけがして発熱や頭痛があり、体のふしぶしが痛く、汗が出ないなどの症状がある「かぜ」のひきはじめや「鼻かぜ」に用いられています。

『ツムラ漢方麻黄湯エキス顆粒』は、「麻黄湯」から抽出したエキスより製した服用しやすい顆粒です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。

(3) 胃腸の弱い人。

(4) 発汗傾向の著しい人。

(5) 高齢者。

(6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

(7) 次の症状のある人。

排尿困難

(8) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
そ の 他	発汗過多、全身脱力感

3. 1ヵ月位(感冒、鼻かぜに服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

●効能・効果

体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：
感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

●用法・用量

次の量を、食前に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	1包(1.875g)	2回
7歳以上15歳未満	2/3包	
4歳以上 7歳未満	1/2包	
2歳以上 4歳未満	1/3包	
2歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

●成分・分量

本品2包(3.75g)中、下記の割合の麻黄湯エキス(1/2量)0.875gを含有します。

日局キョウニン……………2.5g 日局ケイヒ……………2.0g

日局マオウ……………2.5g 日局カンゾウ……………0.75g

添加物として日局軽質無水ケイ酸、日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物を含有します。

●保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
4. 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を用いた製品ですので、製品により多少顆粒の色調等が異なることがありますが効能・効果には変わりありません。
5. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

お問い合わせ先

本製品内容について、何かお気付きの点がございましたら、
お買求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元



お客様相談窓口
電 話 0120-329-930
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)
<https://www.tsumura.co.jp/>